



## Algemeen

De medische reden om tot een besnijdenis (circumcisie) over te gaan is een vernauwing van de voorhuid van de penis. Bij deze aandoening kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Klachten die daardoor kunnen optreden zijn bijvoorbeeld moeilijkheden bij het plassen, pijn tijdens de erectie en geslachtsgemeenschap en een ontsteking rond de eikel. Om geloofsredenen kan vooral bij kinderen tot een besnijdenis worden besloten.

## De behandeling

De operatie houdt in dat de voorhuid losgemaakt wordt van de eikel. Bij een besnijdenis wordt zowel het binnen- als het buitenblad van de voorhuid een stuk ingekort. Daarna wordt de voorhuid met oplosbare hechtingen vastgemaakt aan de rand van de eikel. Door deze ingreep komt de eikel geheel bloot te liggen. Ook kan een chirurg een voorhuidplastiek doen, waarbij de voorhuid wijder wordt gemaakt. De ingreep duurt ongeveer een half uur. Na één tot twee uur raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis weer terug. Het is mogelijk om de behandeling onder plaatselijke verdoving of algehele narcose te laten uitvoeren. Dit kunt u vooraf bespreken met de anesthesist.

## Na de behandeling

Het is verstandig om het op de dag van de ingreep wat rustig aan te doen. Enige pijn is te verwachten. Als pijnstillert kunt u paracetamol tabletten gebruiken. Het plassen kan de eerste keer een branderig gevoel geven. Dit verdwijnt bij doorplassen. Het gaasje dat ter bescherming na de ingreep is aangebracht kan verwijderd worden. Kort na de ingreep ziet de penis er gezwollen en blauw of rood uit. Dit verdwijnt in de loop van de week. Het is het beste om de penis omhoog te leggen richting navel.

Er kan gewoon gedoucht worden, maar het is niet verstandig de eerste week te zwemmen. Op de plaats van de hechtingen ontstaan korstjes die kunnen gaan schrijnen. Dit kunt u verminderen door na het douchen het wondgebied in te smeren met vaseline. Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving. Als de wond genezen is, is geslachtsgemeenschap weer mogelijk.

## Mogelijke complicaties en risico's

Wanneer u telefonisch een afspraak maakt voor een consult of behandeling, zal onze medewerker u een aantal persoonlijke vragen stellen omtrent uw gezondheid. Deze vragen hebben betrekking op onze intakeprocedure.

Wanneer u onder algehele narcose gaat is het belangrijk dat u voor de operatie nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken. De specialist zal dit tijdens het consult met u bespreken.

Wij adviseren u contact op te nemen met de kliniek wanneer de pijn erger wordt, pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of u meer dan 38 graden koorts heeft. Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Ook bij deze operatie zijn er de normale risico's op complicaties van een operatie, zoals nabloeding en wondinfectie. Deze komen echter weinig voor. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar zeer klein.

## Tenslotte

Wij hebben u hierboven algemene informatie over de besnijdenis gegeven. Deze behandeling is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep. U wordt naar beste kunnen behandeld, maar er kan geen garantie gegeven worden op een goed resultaat of een ongestoord verloop.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan verzoeken wij u telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt ook kijken op onze website [www.medinova.com](http://www.medinova.com) voor aanvullende informatie. Wij zijn u graag van dienst!

