



Algemeen

Als uw bovenoogleden hangen of als u wallen onder uw ogen heeft, ontstaat er een bedroefde en vermoeide gezichtsuitdrukking. Hierdoor ziet u er ouder uit dan u in werkelijkheid bent. Hangende bovenoogleden kunnen in extreme gevallen zelfs uw zicht belemmeren. Beide effecten treden vooral op bij mensen die ouder worden, maar ook jongere mensen kunnen erdoor worden geplaagd.

Bij een ooglidcorrectie verplaatst of verwijdert de plastisch chirurg de overtollige hoeveelheden vet en huid, zodat u er jonger en frisser uitziet. De ooglidcorrectie kan een onderdeel vormen van een grotere ingreep in uw ooggebied. U kunt bijvoorbeeld meteen kraaienpootjes of rimpeltjes rondom uw ogen laten verwijderen. Hiervoor bestaan diverse behandelmogelijkheden. Als uw wenkbrauwen zijn gaan hangen, kunt u beslissen deze eveneens te laten behandelen.

Onderzoek

De plastisch chirurg overlegt met u wat de problemen zijn met uw ooggebied en wat u hieraan wenst te laten doen. Hij legt u uit welke operatietechnieken voor u het meest geschikt zijn en bespreekt de voor- en nadelen hiervan. Op deze manier kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

De behandeling

Een ooglidcorrectie wordt doorgaans in dagbehandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De ingreep neemt ongeveer 30-60 minuten in beslag.

Het sneetje dat de plastisch chirurg maakt zal onderhuids met een fijne hechting worden gesloten. Betreft de ingreep de onderzijde van uw ooglid, dan plaatst hij het sneetje exact onder de wimperlijn. Hier verwijdert hij de overtollige hoeveelheden huid, vet en spier. De plastisch chirurg sluit de huid met fijne hechtingen. Indien het alleen nodig is om wat overtollig vet weg te halen, kan hij een sneetje maken aan de binnenzijde van het ooglid. De hechtingen die hij dan moet plaatsen, zijn van het type dat vanzelf oplost.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling zal de doktersassistente uw oogleden met koude kompressen koelen om een eventuele zwelling tegen te gaan. Na maximaal 1 uur kunt u doorgaans naar huis.

Het is mogelijk dat u wat last heeft van blauwe plekken of een geringe zwelling. Aan het herstel hiervan kunt u zelf bijdragen door de eerste twee dagen uw oogleden te koelen en door te slapen met een extra kussen onder uw hoofd. Hierdoor ligt uw hoofd hoger dan de rest van uw lichaam. U kunt de eerste week beter niet bukken of tillen, omdat dit de druk in het behandelde gebied verhoogt.

Na ongeveer zeven dagen worden de hechtingen verwijderd. U maakt dan meteen een afspraak voor een controle door de plastisch chirurg. Hoe snel u weer kunt gaan werken, hangt voor een belangrijk deel af van uw eigen inschatting wanneer u weer "toonbaar" bent. Aangeraden wordt om 5 tot 14 dagen na de ingreep geen contactlenzen te dragen.

Mogelijke risico's en complicaties

Wanneer u telefonisch een afspraak maakt voor een consult of behandeling, zal onze medewerker u een aantal persoonlijke vragen stellen omtrent uw gezondheid. Deze vragen hebben betrekking op onze intakeprocedure.

Ooglidcorrectie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat kans op een infectie, al komt dit bijna nooit voor. Een enkele keer komt er een meer dan normale bloedlekkage voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien.

Ook kan het voorkomen dat u uw ogen de eerste tijd na de ingreep niet geheel kunt openen of sluiten. Om de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u via de arts oogdruppels of zalf verkrijgen die het uitdrogen tegengaan.

In een aantal gevallen treedt bij een onderooglidcorrectie een ectropion op. Hierbij krult de binnenzijde van het onderooglid naar buiten, zodat het niet meer tegen de oogbol aan zit. Het veroorzaakt irritatie en een tranenvloed. Om dit te verhelpen kan een nieuwe ingreep nodig zijn. Ook dit komt zelden voor en meestal verdwijnen de verschijnselen vanzelf.

Tenslotte

Het resultaat van een ooglidcorrectie is meestal langdurig, maar afhankelijk van verdere verslapping van het weefsel. Een nieuwe correctie kan dan gewenst zijn. Hoewel de operatie met de grootste zorg wordt uitgevoerd, kan het moeilijk





MEDINOVA
KLINIEKEN

© augustus 2011

zijn om precies een symmetrisch resultaat te verkrijgen. Wij behandelen u naar beste kunnen, maar er kan geen garantie gegeven worden op het resultaat of een ongestoord verloop. Het is altijd mogelijk dat er complicaties optreden die het eindresultaat negatief kunnen beïnvloeden. Bespreek daarom vooraf met de plastische chirurg de voor- en nadelen om een eventuele teleurstelling te voorkomen.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan verzoeken wij u telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt ook kijken op onze website www.medinova.com voor aanvullende informatie en een uitgebreide fotogalerij. Wij zijn u graag van dienst!



Kliniek Klein Rosendaal Rosendaalselaan 30 6891 DG Rozendaal (GLD) t: 026 - 362 0680 e: kleinrosendaal@medinova.com

www.medinova.com



Dit is een uitgave van Medinova klinieken bedoeld om cliënten en geïnteresseerden te informeren over bovenvermelde behandeling. Deze beschrijving betreft de standaardbehandeling zoals gebruikelijk uitgevoerd in onze klinieken. De behandelend medisch specialist kan een behandeling voorschrijven die afwijkt van deze beschrijving. Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Graag wijzen wij u hierbij op de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) die zich sterk maakt voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Voor het klachten- en privacyreglement verwijzen wij u naar onze website.