



Algemeen

Afstaande oren, ook wel flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. U kunt dit via een oorcorrectie, door een plastisch chirurg, laten corrigeren. Het is bij deze ingreep van belang om een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt wel duidelijke verbetering van de stand verwachten, maar geen perfectie. Absolute symmetrie is bij een correctie van de afstaande oren vrijwel onmogelijk.

Onderzoek

De plastisch chirurg geeft u uitvoerig de gelegenheid om uw klachten te bespreken. Hij onderzoekt de stand van de oren en bepaalt aan de hand daarvan de juiste behandelingsmethode. Daarna legt hij u uit wat de ingreep inhoudt en vertelt hij wat u van het resultaat mag verwachten.

De behandeling

Een oorcorrectie wordt poliklinisch meestal onder plaatselijke verdoving of soms (bijvoorbeeld bij kinderen) onder algehele anesthesie uitgevoerd. Bij de operatie wordt een huidsnede (en dus het litteken) aan de achterkant van het oor aangebracht. Het kraakbenige skelet van het oor wordt gecorrigeerd en een stukje huid aan de achterkant van het oor wordt verwijderd.

Na de behandeling

Na de operatie worden de oren verbonden in de vorm van een zogenaamde tulband of een haarband. Nadat het verband is verwijderd, dient u gedurende drie weken nog voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld sport en het wassen van uw haar. In deze periode zal u 's nachts een zwachtel moeten dragen ter bescherming van de oren. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Dit verdwijnt geleidelijk aan. Tegen de pijn kunt u pijnstillers nemen. Bij extreme pijn en nabloeden moet u direct contact opnemen met de plastisch chirurg. Er komt een litteken achter het oor.

Afhankelijk van de hechtingen die worden gebruikt, lossen deze vanzelf op of worden na één tot twee weken verwijderd. De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed en van een blijvend karakter. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm.

Mogelijke complicaties en risico's

Wanneer u telefonisch een afspraak maakt voor een consult of behandeling, zal onze medewerker u een aantal persoonlijke vragen stellen omtrent uw gezondheid. Deze vragen hebben betrekking op onze intakeprocedure.

Het is voor kinderen belangrijk dat ze voor de operatie nuchter zijn. Dit betekent dat ze zes uur vóór de operatie niet mogen eten en twee uur vóór de operatie niet mogen drinken. Wanneer ze dus 's morgens geopereerd worden, mogen ze geen voedsel meer tot zich nemen. Is de operatie ná 13.00 uur, dan is het toegestaan om in de ochtend nog een licht ontbijt te nemen. De specialist zal dit tijdens het consult bespreken.

Het rechtzetten van afstaande oren heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Beide complicaties komen echter zelden voor. De kans op complicaties is dus wel aanwezig, maar klein.

Tenslotte

De bovengenoemde behandeling is een chirurgische ingreep die vaak uitgevoerd wordt. Veel mensen zijn tevreden over de resultaten, maar toch kan er soms wat te wensen over blijven. Een blijvend goed resultaat, waarbij de beide oren geheel symmetrisch zullen blijven, kan nooit volledig worden gegarandeerd. Een enkele keer zal het noodzakelijk zijn om nog een correctie uit te voeren. Het is altijd mogelijk dat er complicaties optreden die het eindresultaat negatief kunnen beïnvloeden. Bespreek daarom vooraf met de plastische chirurg de voor- en nadelen om een eventuele teleurstelling te voorkomen.

Mocht u na het lezen nog vragen hebben dan verzoeken wij u telefonisch of via e-mail contact met ons op te nemen. U kunt ook kijken op onze website www.medinova.com voor aanvullende informatie en een uitgebreide fotogalerij. Wij zijn u graag van dienst!

